Maîtrise de Physique
Université de Provence
2000/2001

GOYON Cécile

Etude de la cinématique et interprétation physique d'événements tri-électrons de grande impulsion transverse observés à HERA

Rapport de stage
sous la direction de *Claude VALLEE et Cristinel DIACONU*

14 mai-15 juin 2001

Centre de Physique des Particules de Marseille

Table des matières

Introduction **3**

1 Production de paires de leptons à HERA **4**
1.1 Le modèle standard 4
1.2 La production de paires de leptons 5

2 L'accélérateur HERA et le détecteur H1 **9**
2.1 L'accélérateur HERA 9
2.2 Le détecteur H1 10
2.2.1 repère de travail 10
2.2.2 ses composants 11
2.2.3 données enregistrées 13
2.3 Identification et sélection des particules 13
2.3.1 l'identification des particules 13
2.3.2 la sélection des particules 14
2.4 Distributions observées 15

3 Cinematique des événements en excès **16**
3.1 visualisation des événements 16
3.2 détermination de la charge des particules 16
3.3 interprétation cinématique 17
3.4 calcul des propagateurs 19
3.4.1 calcul direct 19
3.4.2 prise en compte des erreurs expérimentales 20
3.4.3 interversion des positrons diffusé et converti 21

4 Conclusion **22**

5 Remerciements **23**

A Evénements étudiés **24**
premier événement :267312 203075 24
deuxième événement :269704 83934 24
troisième événement :168058 42123 24

quatrième événement :83507 16817 24
cinquième événement :192864 123614 24
sixième événement :254959 17892 24

B Résultats cinématiques finaux **31**

Bibliographie **32**

Introduction

Les expériences de diffusion sont un outil de travail essentiel dans l'étude de la structure de la matière. La résolution spatiale à laquelle on sonde la matière varie avec l'énergie $\sqrt{s}$ disponible dans le référentiel du centre de masse en $\frac{1}{\sqrt{s}}$. Dans le collisionneur e-p HERA, les énergies sont telles que l'on peut sonder jusqu'à 10^{-18} m : on peut donc ainsi étudier la structure intime du proton. Une telle résolution permet aussi de s'intéresser aux phénomènes nouveaux qui pourraient résulter de collisions electrons(positrons)/quarks de très haute énergie ; l'équipe H1 du CPPM s'est d'ailleurs spécialisée dans l'étude des interactions rares les plus énergétiques. L'analyse des données prises jusqu'a l'été 2000 a permis de mettre en évidence plusieurs événements de topologie atypique mettant en jeu la production de paires de leptons qui pourraient signer de la nouvelle physique.

Le sujet du stage est d'étudier en détail leur cinématique individuelle pour mieux cerner leur origine. Dans un premier temps, nous étudierons les différents processus standards produisant des paires de leptons, puis, après avoir décrit l'accélérateur HERA et l'expérience H1, nous nous intéresserons plus spécialement à la cinématique des événements à grande impulsion transverse observés en excès.

Chapitre 1

Production de paires de leptons à HERA

1.1 Le modèle standard

Actuellement, le modèle standard est la théorie qui permet de définir la structure de la matière en expliquant le comportement des particules par les interactions qui existent entre elles.

Ce modèle comprend 12 particules (et 12 antiparticules), classées en 3 familles de fermions contenant 2 leptons et 2 quarks :

leptons	e	μ	τ
	ν_e	ν_μ	ν_τ
quarks	u	c	t
	d	s	b

Ces particules peuvent être soumises à quatre forces fondamentales :

- interaction électromagnétique
- interaction faible
- interaction forte
- interaction gravitationnelle

L'interaction gravitationnelle n'est pas considérée dans le modèle standard car son intensité est négligeable devant celles des autres forces (elle est 10^{43} fois plus faible que la force électromagnétique).
L'interaction forte décrit les interactions entre quarks. Elle est associée à la QCD (ChromoDynamique Quantique), définissant une charge dite de couleur pour les quarks et les gluons : il y a 3 couleurs différentes, mais seuls sont visibles les états de combinaisons neutres de couleur. Il est donc par là-même interdit d'observer

des quarks à l'état libre.
Les interactions faible et électromagnétique ont été finalement unifiées en 1967 par Weinberg et Salam (première tentative par Glashow en 1961); tout phénomène électrofaible peut en fait s'interpréter par l'échange d'un photon ou d'un boson lourd Z^o ou W. Cette théorie électrofaible introduit le champ de Higgs et son boson associé, expliquant la masse des particules, mais ce boson échappe toujours à sa traque dans les accélérateurs de particules, malgré une suspicion de découverte au LEP (CERN) il y a quelques mois.

1.2 La production de paires de leptons

Cette partie présente tous les processus possibles produisant une paire de leptons avec éventuellement un électron isolé supplémentaire dans un collisionneur e-p, les leptons produits étant mesurés avec une grande impulsion transverse.
Ces processus sont au nombre de trois :

- le processus Drell-Yan
- le processus photon-photon
- le processus Cabibbo-Parisi

1. **Drell-Yan**



Figure 1.1: processus Drell-Yan

L'électron incident émet un photon qui se matérialise en paire quark/antiquark; l'antiquark réagit avec le quark correspondant du proton pour donner une paire de leptons.

2. **photon-photon**

Il existe deux contributions à ce processus ; l'une est élastique et l'autre inélastique :

- $\gamma\gamma$ élastique



Figure 1.2: processus $\gamma\gamma$ élastique

Le proton et l'électron incident émettent chacun un photon, qui viennent tous deux interagir pour donner une paire de leptons. L'électron incident peut être perdu dans le tube à vide, ou diffusé dans le détecteur si le photon émis est assez virtuel.

- $\gamma\gamma$ inélastique



Figure 1.3: processus $\gamma\gamma$ inélastique

Les photons sont émis par l'électron incident et un des quarks de valence du proton; ils interagissent de même pour donner une paire de leptons. Cette réaction est dite inélastique car le proton est brisé en ses composants.

3. **Cabibbo-Parisi**



Figure 1.4: processus Cabibbo-Parisi

Un photon quasi-réel est émis par le proton et se matérialise en une paire e^+/e^-. Un des deux électrons de la paire interagit alors avec l'électron incident pour donner une paire de leptons.

Ces trois phénomènes peuvent être caractérisés par la section efficace de production de paire de leptons en fonction de l'impulsion transverse des leptons.



____ $\gamma\gamma$ total, __ _ _ __ $\gamma\gamma$ élastique, __ _ _ _ __ $\gamma\gamma$ inélastique _ _ _ Drell-Yan VDM, _ . . _ . . _ Drell-Yan pointlike, _ _ _ Cabibbo-Parisi e^+e^-, _ . _ . _ Cabibbo-Parisi $\mu^+\mu^-$

Figure 1.5: section efficace en fonction de l'impulsion transverse

Nous voyons que la contibution du processus Drell-Yan reste négligeable devant celle des autres processus quelle que soit l'impulsion transverse, que le processus $\gamma\gamma$ est dominant sauf pour des impulsions transverses de l'ordre de 40 Gev où les contributions des processus $\gamma\gamma$ et Cabibbo-Parisi deviennent équivalentes.

Chapitre 2

L'accélérateur HERA et le détecteur H1

2.1 L'accélérateur HERA

HERA (Hadron Elektron Ring Anlage) est un accélérateur circulaire de 6,3 km de circonférence situé sur le site de DESY (Deutsche Elektronen SYnchrotron) à Hambourg.



Figure 2.1: Vue de l'accélérateur

L'accélérateur est constitué de deux anneaux indépendants dans lesquels tournent en sens inverse un faisceau de protons et un faisceau d'électrons (ou de positrons). Le faisceau d'électrons est composé de 210 paquets de 4.10^{10} particules séparés de 96 ns produits dans le préaccélérateur LINAC I, accélérés jusqu'à 12 GeV dans PETRA II et finalement injectés dans HERA où ils acquièrent l'énergie de 27,5 GeV. Les protons sont créés à partir d'hydrogène, par paquets de 10^{11} particules; le faisceau est composé de 210 paquets séparés de 96 ns avec les protons accélérés à 40 GeV puis injectés dans HERA où ils atteignent leur énergie nominale de 820 GeV (920 GeV à partir de 1998), soit une énergie dans le centre de masse de $\sqrt{s}$ = 300 GeV (320 GeV). Le collisionneur fonctionne depuis 1992 et actuellement quatre expériences sont installées sur le site :

H1 et ZEUS : expériences généralistes, qui étudient la structure du proton et recherchent des processus au-delà du modèle standard.

HERA-B : conçue pour la physique du quark b (violation CP).

HERMES : dédiée à la fonction de structure des protons polarisés.

2.2 Le détecteur H1

La collision entre un électron (positron) et un proton dans HERA produit de nombreuses particules : l'électron diffusé, les restes du proton émis sous forme de paquets de particules, les “jets”, ainsi que d'autres particules éventuelles. La détection et mesure de ces particules a nécessité la conception d'un détecteur très spécifique, tel H1. Ce détecteur doit permettre de mesurer tous les paramètres nécessaires pour reconstruire précisément l'événement enregistré. Du fait de la grande différence d'énergie entre les faisceaux incidents, le détecteur est asymétrique afin de récupérer le maximum d'informations sur les particules entraînées dans la direction du proton incident, vers l'avant.

2.2.1 repère de travail

Pour déterminer les différentes variables cinématiques dont nous avons besoin, nous devons définir un repère, fixe dans le référentiel du laboratoire et tel que :

- l'origine est prise au niveau du vertex de l'interaction positron-proton
- l'axe des z est choisi dans la direction du faisceau de protons incidents. On appelle avant du détecteur la région des z positifs, et arrière celle des z négatifs.
- l'axe des y est pris dans la direction de la verticale ascendante

- l'axe des x est fixé de façon à obtenir un repère direct
- θ est l'angle polaire entre l'axe des z et la particule produite
- ϕ est l'angle azimuthal mesuré à partir de l'axe des x

Chaque particule est donc caractérisée par son énergie E_i, ses angles θ_i et ϕ_i

Aux énergies auxquelles nous travaillons, nous pouvons négliger les masses des particules devant leur énergie cinétique, les quadri-vecteurs des particules peuvent donc s'écrire de la façon suivante : (E_i , E_i sin θ_i cos ϕ_i , E_i sin θ_i sin ϕ_i , E_i cos θ_i).

L'impulsion transverse de la particule est alors : $P_T = E_i \sin \theta_i$.

2.2.2 ses composants

Ses constituants sont premièrement les détecteurs de trace, notamment les trajectographes en silicium (semi-conducteurs qui laissent passer le courant quand ils sont traversés par une particule chargée) permettant, grâce à leur résolution spatiale très élevée, de déterminer avec précision la position du vertex d'interaction, ainsi que les chambres proportionnelles à fils et à dérive, permettant de reconstituer les trajectoires des particules chargées. Ces chambres sont remplies de gaz, ionisé lorsque les particules chargées traversent l'enceinte ; les électrons arrachés sont alors collectés sur les fils et, en fonction de leur position et du temps de dérive des charges, on peut reconstituer les trajectoires. Ces chambres sont entourées d'une bobine supraconductrice fournissant un champ de 1,15 T qui permet de déterminer la charge et l'impulsion des particules chargées dans les détecteurs de traces.

Pour mesurer l'énergie des particules détectées, on utilise des calorimètres dont le principe est de faire perdre toute leur énergie aux particules en les faisant interagir avec la matière. Lors d'une réaction avec la matière, la particule produit une gerbe de particules secondaires et perd de l'énergie, le calorimètre est donc composé de zones de matière alternées avec des zones de détection pour repérer les particules créées. Le nombre de particules créées est directement relié à l'énergie de la particule incidente par calibration du calorimètre. Pour enregistrer le maximum d'informations sur les particules résultant de la collision, quatre calorimètres différents sont utilisés dans H1 :

- Plug : à l'avant du détecteur, il permet de récupérer les particules qui s'échappent à petit angle; il est constitué de couches de cuivre et de détecteurs en silicium.
  $0.6^o < \theta < 3.5^o$
  résolution $\frac{\sigma_E}{E} = \frac{150\%}{\sqrt{E}}$