Stage de maîtrise
sous la direction de Cristinel Diaconu

Mesure de la section efficace des courants chargés à grand transfert d'impulsion dans l'expérience H1

Jessica LEVEQUE

17 Mai-18 Juin 1999

Centre de Physique des Particules de Marseille

Table des matières

Chapitre 1

Introduction

Une expérience de physique des particules a pour objectif de tester les théories susceptibles de fournir une explication de la structure de la matière . Les résultats permettent aux théoriciens d'affiner leurs modèles ou de poser des limites les contraignant lorsque les prédictions ne sont pas vérifiées .

Le sujet de ce stage est de présenter la méthode utilisée pour l'analyse des données recueillies auprès du détecteur H1 , et de l' appliquer à la mesure de la section efficace des courants chargés. L'étude de ces événements permet de tester les prédictions de la chromodynamique quantique (calcul de la probabilité de réalisation du processus).De plus cette étude ayant déjà été faite pour les positrons ,elle fournit un moyen de comparer le comportement particule/antiparticule.

Dans une première partie , nous décrirons quelques aspects du modèle actuellement adopté pour décrire la structure de la matière ainsi que les processus sur lesquels porte notre étude. La seconde partie traitera du dispositif expérimental et de la prise de données . Enfin , la dernière partie sera consacrée à l'analyse de ces données et aux résultats expérimentaux .

Chapitre 2

La physique à HERA

Notre objectif ici est d'abord de décrire aussi brièvemment que possible les différentes représentations actuelles de la structure de la matière afin de justifier les expériences menées dans le domaine des haute énergies à HERA , et d'autre part , de présenter la physique des phénomènes que nous étudierons dans la suite.

2.1 Le modèle standard

2.1.1 Particules

Le modèle standard est la théorie actuellement adoptée pour décrire la structure de la matière. Il comprend:

- 12 particules (et leurs anti-particules) classées en 3 familles de fermions (tableau 2.1)
- 4 interactions portées par des bosons vecteurs (tableau 2.2)

	Fermions			Charge
Leptons	ν_e	ν_μ	ν_τ	0
	e	μ	τ	-1
Quarks	u	c	t	+2/3
	d	s	b	-1/3

Tableau 2.1: les 3 familles de fermions

interaction	médiateur	masse	action
électromagnétique	photon	0	particules chargées
faible	$Z°$,$W^\pm$	91.2,80.3 GeV	toutes les particules
forte	gluons(8)	0	quarks

Tableau 2.2: interactions fondamentales

La gravitation n'est pas prise en compte ici car son action sur les particules est beaucoup plus faible que les 3 autres (de l'ordre de 10^{-41} plus faible que la force électromagnétique)

2.1.2 L'interaction électrofaible

Tout phénomène électromagnétique peut se comprendre dans le cadre de l'-ElectroDynamique Quantique (QED) comme l'interaction entre un fermion électriquement chargé et un photon.Cette théorie à été développée par Dirac et finalisée par les travaux de Feynman,Schwinger et Tomonaga à la fin des années 40.

L'interaction électrofaible est élaborée par Fermi en 1933 pour expliquer la radioactivite β.

Une première tentative d'unification de ces deux interactions est proposée par Glashow en 1961 à partir de théories développées par Yang et Mills.Le problème de son modèle réside dans l'abscence d'une explication pour les masses des particules.

La théorie électrofaible finale est proposée en 1967 par Weinberg et Salam qui intègrent au modèle de Glashow le mécanisme de Higgs : introduction du champ de Higgs et de son boson vecteur qui confèrent la masse aux particules.

La découverte des courants neutres et chargés, ainsi que celle des bosons massifs Z° et W^+,W^- a permis de vérifier une grande partie des prédictions. Cependant,le boson de Higgs n'a pas encore été mis en évidence par les expériences de physique des particules.

2.1.3 L'interaction forte

Cette théorie développée par Gell-Mann au début des années 70 décrit les interactions entre quarks.Elle permet de calculer la fonction de structure du proton (répartition et densité de quarks) , que l'on peut relier à la section efficace. Ce modèle porte aussi le nom de ChromoDynamique Quantique (QCD) car seules y sont sensibles les particules portant une charge de couleur : les quarks et les gluons, porteurs de l'interaction. La nécéssité d'introduire la couleur s'est présentée lors de la découverte de particules de spin 3/2 comme le Δ^{++} et le Δ^{--}, dont les contenus en quarks $(u^\uparrow u^\uparrow u^\uparrow et d^\uparrow d^\uparrow d^\uparrow)$ sont interdits par le principe de Pauli. Il fallait donc inventer un nouveau nombre quantique pour différencier ces quarks. Il existe trois couleurs différentes (rouge,bleu,vert) ainsi que leurs "anti-couleurs" portées par les antiquarks et ces état de base ne peuvent former que des combinaisons de couleur neutre:

- trois quarks de couleurs différentes : ce sont des baryons
- un quark et un antiquark : ce sont les mésons

Ce qui nous interdit d'observer des quarks à l'état libre.

2.2 Au-delà du modèle standard

2.2.1 Les problèmes du modèle standard

Le modèle standard donne une explication satisfaisante des interactions entre particules. Il a été maintes fois testé et ses prédictions n'ont jamais été mises en défaut jusqu'ici . Cependant , il existe un certain nombre de questions auxquelles il ne répond pas .

- Le modèle ne fournit aucune explication sur le nombre de générations de quarks et de leptons . Expérimentalement , la mesure de la largeur du $Z°$ implique que ce nombre doit être égal à trois .
- Le modèle standard compte 18 paramètres dont il ne fixe pas la valeur :
  - masse des quarks et des leptons (9)
  - 3 angles de mélange et la phase de la matrice CKM *
  - constante de couplage électromagnétique
  - constante de couplage forte
  - masse des bosons intermédiaires $Z°$ et $W^{\pm}$
  - masse du boson de Higgs

  Une grande partie des expériences a pour but de contraindre les valeurs de ces paramètres , et à l'heure actuelle , seul le dernier n'a pas été mesuré.Il existe quand même des limites : si le Higgs a une signification physique, sa masse doit être inférieure à 1 TeV , et les recherches actuellement menées au LEP nous fixent $M_H > 89 GeV/c^2$.
- Brisure de symétrie : seules les particules de chiralité gauche participent à l'interaction faible , ce que le MS n'explique absolument pas .
- Les charges des fermions ne sont pas fixées.
- Enfin , le MS ne tient pas compte de la gravitation .

2.2.2 Autres modèles

Le modèle standard n'est pas une théorie unificatrice puisqu'elle laisse de coté une des interactions , et ses manques semblent en faire une “ approximation à basse énergie“ d'une théorie plus fondamentale qui reste à déterminer . Divers modèles ont été proposés pour tenter de combler ses lacunes.

- La supersymétrie (SUSY): généralisation des symétries d'espace-temps, qui associe un fermion à un boson et vice-versa .L 'extension Minimale Supersymétrique du Modèle Standard (MSSM) consiste à ajouter au MS les partenaires supersymétriques des fermions et des bosons .Ce modèle explique la brisure de symétrie électrofaible , mais aucune preuve expérimentale des nouvelles particules n'a été trouvée .
- Grande unification (GUT) : les interactions faible ,forte et électromagnétique sont unifiées à des énergies très élevées (10^{15} GeV). Les charges des particules sont quantifiées , mais le nombre de générations reste inexpliqué.

- Les modèles composites : le nombre de constituants actuellement considérés comme élémentaires (6 quarks,6 leptons et leurs anti-particules) est relativement important.C'est pourquoi certains pensent qu'il existe une structure commune à ces particules . Ces modèles ont pour ambition d'expliquer les 3 familles de particules et leur masse . La manifestation expérimentale d'une telle sous-structure serait la découverte de fermions excités (actuellement recherchés dans H1) , ou de nouvelles interactions entre les constituants des fermions et des bosons.

2.3 La physique des interactions électron-proton à HERA

Dans cette section , nous allons nous attacher à décrire les phénomènes physiques observables lors d'une collision électron-proton , en insistant plus particulièrement sur les diffusions profondément inélastiques et la cinématique des courants chargés , puisque ce sera notre sujet d'étude.

2.3.1 Diffusion profondément inélastique (DIS)

Les diffusions profondément inélastiques sont gouvernées par les interactions faible et électromagnétique.Pour pouvoir distinguer les processus faibles de ceux issus des autres interactions , il faut se placer dans une configuration pour laquelle le transfert d'énergie de l'électron au proton (notée Q^2) est très grande . Or la résolution spatiale explorée par la particule échangée lors de l'interaction s'écrit $\Delta \approx \frac{hc}{\sqrt{Q^2}}$. Dans notre cas , en considérant des transferts d'impulsion supérieurs à 100 Gev, c'est en fait une interaction électron-quark que l'on étudie puisque les dimensions sondées sont de l'ordre de $10^{-18}m$.

- Interaction à courant neutre (NC) : $ep \longrightarrow eX$

  La particule échangée entre l'électron et le proton incidents est un boson de jauge γ ou Z° . L'électron est diffusé à grand angle et un ou plusieurs jets de hadrons lui sont opposés. La figure 2.6 montre un événement reconstruit dans H1 .

- Interaction à courant chargé (CC) : $ep \longrightarrow \nu X$

  La particule échangée est un W^- . L'électron se “transforme” en un neutrino qui n'est pas détecté . L'état final est seulement constitué du jet provenant du quark éjecté . Ce type d'événements n'est pas balancé en impulsion transverse,comme on peut le voir sur la coupe du détecteur de la figure 2.7

L'étude des courants chargés nécéssite l'utilisation de variables cinématiques permettant d'isoler leurs caractéristiques et de reconstruire l'interaction . Nous utiliserons les quantités suivantes :

$e = (0, 0, -E_e, E_e)$ quadri impulsion de l'électron incident

$p = (0, 0, E_p, E_p)$ quadri impulsion du proton incident



Figure 2.1: diffusion profondément inélastique positron/proton

$e' = (E'_e sin\theta_e sin\phi_e, E'_e sin\theta_e, E'_e cos\theta_e, E'_e)$ quadri impulsion de l'électron diffusé

$s = (e+p)^2 = 4E_eE_p$ carré de l'énergie disponible dans le CM

$q^2 = (e-e')^2 = -Q^2$ carré de la quadri impulsion de transfert

$y = \frac{q.p}{e.p}$ fraction de l'énergie de l'électron incident transférée au proton

$x = \frac{Q^2}{2q.p} = \frac{Q^2}{y.s}$ fraction de l'impulsion du proton emportée par le quark diffusé

${P_T}^{hadrons} = \sqrt{[({P_x}^{had})^2 + ({P_y}^{had})^2]} = E_h sin\theta_h$ impulsion transverse des hadrons

${P_z}^{hadrons} = E_h cos\theta_h$ impulsion selon z des hadrons

${P_T}^{miss} = -(\Sigma {P_T}^{hadrons})$ impulsion transverse manquante

L'état final du système n'est défini que par l'ensemble des jets hadroniques. Les quadri impulsions initiales e et p étant connues , l'ensemble de la cinématique peut être exprimée à partir de 2 variables indépendantes , nous prendrons Q^2 et x. Il existe quatre méthodes de reconstruction de la cinématique :

- la méthode électron , qui utilise l'énergie de l'électron diffusé et son angle de diffusion θ_e (pour les NC)
- la méthode Jacquet-Blondel , qui utilise les variables hadroniques E_h et θ_h
- la méthode sigma utilise un mélange des 2 méthodes précédentes qui minimise les erreurs
- la méthode double angle utilise les angles de diffusion des hadrons θ_h et de l'électron θ_e.

Dans notre cas , seule la méthode Jacquet-Blondel est utilisable. Les variables cinématiques x , y , Q^2 sont calculées à partir du système hadronique:

$$y_{jb} = \frac{\Sigma(E_h - P_z{}^{had})}{2E_e} \tag{2.1}$$

$$Q^2{}_{jb} = \frac{(\Sigma P_x{}^{had})^2 + (\Sigma P_y{}^{had})^2}{1 - y_{jb}} \tag{2.2}$$

$$x_{jb} = \frac{Q^2{}_{jb}}{y_{jb}.s} \tag{2.3}$$

2.3.2 Autres processus

- Processus à deux photons :

  Interaction entre deux photons quasi-réels émis par les particules incidentes. Cette interaction est matérialisée en une paire de leptons ou de quarks.



Figure 2.2: processus à deux photons

- Diffusion Compton (QED) : $ep \longrightarrow e\gamma p(X)$

  L'interaction a lieu entre l'électron incident et un photon émis par le proton . Cette diffusion peut être élastique $ep \longrightarrow e\gamma p$ ou inélastique $ep \longrightarrow e\gamma X$ (le proton explose en jets).



Figure 2.3: Diagrammes de diffusion compton

- Photoproduction : $\gamma + p \longrightarrow X$

  Un photon quasi-réel ($Q^2 \approx 0$) interagit avec les constituants du proton (quark ou gluon).

  - photon résolu : il se matérialise en méson avant d'interagir



Figure 2.4: processus avec un photon résolu

  - processus direct



Figure 2.5: processus avec photon direct

- Production de W et $Z°$:

  Les sections efficaces de ces événements sont très faibles : 70 fb pour le W, et encore 10 fois moins pour le $Z°$.



Figure 2.6: événement courant neutre



Figure 2.7: événement courant chargé

Chapitre 3

L'accélérateur HERA et le détecteur H1

Il est nécéssaire de décrire les instruments par lesquels se fait l'acquisition des données .Après une description générale du collisionneur HERA et du détecteur H1, nous insisterons sur les sous-détecteurs les plus utiles pour notre étude : le calorimètre à argon liquide et les détecteurs de traces .

3.1 L'accélérateur HERA

Le collisionneur HERA est construit sur le site de DESY à Hambourg.C'est un anneau de 6.3 km de circonférence en fonctionnement depuis 1992.Il est représenté sur la figure 3.1 .



Figure 3.1: Le site de DESY à Hambourg

Quatre expériences sont actuellement installées sur HERA :

- H1 et ZEUS ayant comme but principal la mesure de la fonction de structure du proton
- HERMES , une experience dédiée à l'étude de la fonction de structure des protons polarisés
- HERA-B , orienté vers l'étude du quark b.

3.1.1 Préaccélérateurs

La probabilité des DIS étant faible par rapport aux photoproductions , de nombreuses collisions sont nécéssaires pour pouvoir observer les phénomènes qui nous intéressent . Les protons et les électrons sont regroupés par paquets et tournent en sens inverse dans des anneaux différents . Ainsi , un même paquet peut être réutilisé à chaque croisement .

Les faisceaux sont crées et préaccélérés avant d'entrer dans HERA.

- Les électrons sont produits dans le préaccélérateur LINAC I , regroupés par paquets de 4.10^{10} particules et accélérés jusqu'à 12 GeV dans l'anneau PETRA II avant d'être injectés puis accélérés dans HERA. On obtient alors 70 paquets d'électrons d'énergie 27.5 GeV. L'opération est répétée trois fois pour atteindre 210 paquets .
- Les protons proviennent d'ions hydrogène .Les 70 paquets sont accélérés à 40 GeV dans PETRA puis envoyés dans HERA . L'opération est répétée pour obtenir 210 paquets de protons de 920 GeV.

Les paquets de particules sont séparés de 96 ns . L'énergie disponible dans le centre de masse est importante : $\sqrt{s} \approx 318GeV$

3.1.2 Luminosité

La luminosité est une caractéristique importante des faisceaux , correspondant au nombre de particules fournies par unité de surface et de temps. Elle est déterminée en étudiant des diffusions dont la section efficace est parfaitement calculable (collisions e^+ - e^-) : c' est le rapport entre le nombre d'événements observés et la section efficace. La figure 3.2 montre la luminosité intégrée mesurée dans H1 depuis sa mise en service. Entre 92 et 98 , HERA a fonctionné en mode positrons - protons , et le faisceau de positrons a été remplacé en 1998 par des électrons.



Figure 3.2: Luminosité intégrée délivrée par HERA depuis 1992

3.2 Le détecteur H1

3.2.1 Description générale

La direction z est celle des protons incidents . L'axe y pointe vers le haut du détecteur et x est tel que le trièdre xyz soit direct.L'origine du repère est le point où doivent avoir lieu les interactions . L'angle θ est défini par rapport à la direction $z > 0$ et l'angle azymutal ϕ par rapport à l'axe x .

Le détecteur est asymétrique du fait de l'importante énergie donnée aux protons : la majorité des produits de l'interaction sera projetée vers l'avant (direction des protons incidents).

Description rapide des différents éléments qui le composent :

- détecteurs de traces : chambres centrales , avant et arrière , qui permettent de reconstruire les trajectoires .
- 4 calorimètres différents permettent de mesurer l'énergie des particules.
- Bobine supraconductrice : fournit un champ magétique suffisamment puissant (1.2 T) pour courber les trajectoires des particules , ce qui permet de mesurer leur impulsion transverse et leur charge.
- détecteur de muons : ces particules interagissent très peu avec la matière. On ne peut pas mesurer leur énergie mais seulement détecter une trace.Ce détecteur encercle complètement H1 . (voir Ch 4.3 "événements particuliers")

3.2.2 Les détecteurs de traces

Ces détecteurs ne sont sensibles qu'aux particules chargées.La reconstruction des traces permet de trouver la position du vertex (lieu de l'interaction) et de mesurer les angles de diffusion des jets de hadrons. L'application d'un champ magnétique courbe les trajectoires , dont le rayon de courbure R est relié à la charge des particules et à leur impulsion transverse P_T :

$P_T = qRB$ et $Pc \approx 300RB$ (avec R en mètre et B en Tesla)

3.2.3 Le calorimètre

Principe : les particules interagissent avec la matière du calorimètre et perdent la totalité de leur énergie en créant des gerbes de particules secondaires. L'alternance de matériaux où la production de gerbes est importante avec des zones de détection permet de mesurer l'énergie déposée par la particule incidente.La relation entre son énergie et celle mesurée dans le calorimètre est donnée par la calibration (mesures effectuées en connaissant l'énergie des particules incidentes). Ce type de détecteur possède plusieurs avantages , en particulier celui de différencier les électrons et les photons des hadrons par la forme des gerbes créées : les premières sont très compactes (dues à l'interaction électromagnétique) et situées au début du calorimètre , tandis que les hadrons doivent traverser davantage de matière pour perdre toute leur énergie (ionisation et interaction forte). Le calorimètre est donc partagé en deux parties , électomagnétique et hadronique. Un second intérêt provient de la segmentation de ce détecteur , qui permet d'obtenir des informations sur le développement de la gerbe et ainsi de remonter à la trajectoire et à l'angle des particules incidentes.

Quatre calorimètres différents sont utilisés dans H1 :

- LAr : calorimètre à Argon Liquide . C'est le plus volumineux et le plus utilisé dans l'analyse , il couvre la partie centrale et l'avant du détecteur ($4° < \theta < 154°$). Il est constitué de plaques de plombs baignées dans l'argon Liquide pour la partie électomagnétique , remplacées par de l'acier pour la partie hadronique.

- PLUG : constitué de couches de cuivres et de détecteurs en silicium.

  ($0.6° < \theta < 3.5°$)

- SpaCal : (Spaghetti Calorimeter) mesure l'énergie des particules diffusées vers l'arrière. ($155° < \theta < 178°$)

- fer instrumenté : permet de mesurer l'énergie des gerbes hadroniques qui ne sont pas totalement absorbées par les autres calorimètres.

3.3 Aquisition des données et analyse des événements dans H1

Les croisements de faisceaux ont lieu toutes les 96 ns ,tandis que la lecture de tous les détecteurs et la reconstruction complète de l'événement prend 200 ms.Il n'est donc pas possible de reconstruire toutes les interactions provoquant un signal dans le détecteur.D'autre part , le volume des données mises en mémoire devient rapidement important.Ceci explique la nécéssité d'avoir un système de lecture rapide des informations fournies par les détecteurs , ainsi qu'un système de décision pour identifier les événements susceptibles de nous interesser.Ce système est basé sur plusieurs niveaux de sélection , utilisant des informations de plus en plus complètes afin de rejeter au maximum le bruit de fond sans gêner la physique attendue ,et en limitant les effets systématiques qui peuvent avoir lieu : particules secondaires issues d'interactions protons/tube ou proton/gaz résiduel , muons cosmiques ...

3.3.1 Les niveaux de décision

- Niveau L1 : vérifie si le temps d'arrivée d'une particule dans le détecteur est corrélée à un croisement de faisceau.
- Niveau L2 et L3 : vérifient la corrélation des réponses données par les différents détecteurs.Les événements sont rejetés en faisant avorter la procédure de lecture des détecteurs.
- Niveau L4 : l'écriture sur le disque est amorcée ainsi que la reconstruction des traces . On peut ansi effectuer des tests et supprimer les événements qui ne vérifient pas certains critères.
- Niveau L5 : reconstruction des trajectoires et réduction des données au format DST (Data Summary Tape),structurées par événements.Chaque utilisateur peut ensuite créer des n-tuples ($\approx$ tableaux dont les lignes représentent les événements et les colonnes des variables telles que l'énergie, l'impulsion...) à partir de ces DST.

Notre travail se situe au niveau de l'utilisation des n-tuples sur lesquels a déjà été appliqué le critère $P_T > 10GeV$

3.3.2 Simulations Monté-Carlo

L'utilisation de logiciels de simulation présente plusieurs étapes :

- La simulation des processus de base dans l'interaction électron-proton permet de générer des événements conformes aux prédictions théoriques (probabilité de l'événement , valeurs des variables cinématiques).
- La simulation de l'interaction des particules résultantes avec le détecteur permet d'obtenir la fonction de réponse du détecteur en comparant les variables cinématiques réelles (simulées) aux variables mesurées.

La simulation étant idéale , il faut lui ajouter des événements réels de bruits de fond.Elle nous fournit alors une représentation des phénomènes physiques attendus et un moyen de comparer les données réelles aux prédictions.