DEA Physique des Particules, Physique Mathématique et Modélisation

Jessica LEVEQUE

Production de paires d'électrons à HERA

Stage de DEA effectué sous la direction de Claude VALLEE

mars-juin 2000

Centre de Physique des Particules de Marseille
163, Avenue de Luminy
13288 Marseille

Table des matières

Introduction

La représentation actuelle de la structure de la matière est contenue dans une théorie appelée modèle standard. Ce modèle considère 12 particules élémentaires de matière (et leurs anti-particules), 12 bosons de jauge qui véhiculent 3 des quatres interactions fondamentales (la gravitation n'est pas prise en compte), et une particule scalaire qui donne la masse aux autres particules, le boson de Higgs. L'ensemble de ces particules est rassemblé dans les tableaux 0.1 et 0.2.

	Fermions			Charge électrique
Leptons	ν_e	ν_μ	ν_τ	0
	e	μ	τ	-1
Quarks	u	c	t	+2/3
	d	s	b	-1/3

Tableau 0.1: les 3 familles de fermions

interaction	médiateur	masse	action
électromagnétique	photon	0	particules chargées
faible	Z°,$W^\pm$	91.2 ; 80.3 GeV	toutes les particules
forte	gluons(8)	0	quarks

Tableau 0.2: interactions fondamentales

Ce modèle est testé depuis les années 70 dans les accélerateurs de particules et ses prédictions n'ont pour l'instant jamais été mises en défaut. Seul le Higgs reste à découvrir. Plusieurs modèles de remplacement existent pour parer aux insuffisances du modèle actuel, qui ne prend pas en compte toutes les interactions, n'explique pas les trois générations de particules... Mais rien ne peut permettre pour l'instant de choisir l'un d'eux.

L'objet de ce stage a été d'étudier la création de paires d'électrons dans l'accélérateur HERA, en particulier à haute énergie, afin de tester les prédictions théoriques du modèle standard et de rechercher une indication de nouvelle physique. Ce travail se place dans le cadre d'études préliminaires pour l'augmentation de luminosité à HERA prévue autour de 2001.

Chapitre 1

Production des paires de leptons : aspects théoriques et motivations

Cette première partie explique le processus qui fait intervenir deux photons dans les interactions lepton-proton à HERA. Nous décrirons ensuite le processus de production des paires de leptons selon le modèle théorique implémenté dans le générateur Monte Carlo LPAIR utilisé dans notre analyse. Enfin, nous exposerons les motivations de cette étude.

1.1 La production de paires de leptons dans les collisions photon-photon à HERA

Le processus à deux photons est présenté sur la figure 1.1. Le lepton et le proton incidents émettent chacun un photon, et l'interaction entre ces deux photons génère une paire de leptons.



Figure 1.1: création d'une paire de leptons par un processus photon-photon

Ce processus est caractérisé par les quadri-vecteurs d'échange $\mathbf{q_1}$ et $\mathbf{q_2}$ entre les particules initiales et les photons émis. Ils sont définis de la façon suivante : $\mathbf{q_1^2} = (\mathbf{k} - \mathbf{k'})^2$ et $\mathbf{q_2^2} = (\mathbf{p} - \mathbf{p'})^2$ où $\mathbf{k}$ et $\mathbf{k'}$ sont les quadri-impulsions de l'électron incident et diffusé, et $\mathbf{p}$ et $\mathbf{p'}$ celles du proton avant et après interaction.

Pour le vertex d'interaction qui met un jeu un fermion élémentaire, le courant s'écrit :

$$< e, \mathbf{k'} | J^{\mu}_{elmag} | e, \mathbf{k} >= \bar{u}(k')\gamma^{\mu}u(k)$$

Pour le vertex qui met en jeu un proton, on ne peut plus utiliser l'approximation des particules ponctuelles. Le comportement des constituants du proton, quarks de valence et de la mer, ne pouvant être décrit par la QCD perturbative, on utilise une méthode plus phénoménologique. On introduit un vecteur de Lorentz Γ^{μ} qui permet d'écrire :

$$< p, \mathbf{p'} | J^{\mu}_{elmag} | p, \mathbf{p} >= \bar{u}(p')\Gamma^{\mu}u(p)$$

et de garder ainsi une expression similaire à celle d'un électron.

Ce vecteur dépend des quadri-impulsions de transfert q_2^{μ} et du proton p^{μ}, et dans l'hypothèse d'invariance sous transformation de jauge on peut l'écrire avec seulement deux termes :

$$\Gamma^{\mu} = F_1(q^2)\gamma^{\mu} + i\frac{\kappa}{2m_p}F_2(q^2)p^{\nu}\sigma_{\mu\nu} \quad \sigma_{\mu\nu} = \frac{i}{2}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu} - \gamma^{\nu}\gamma^{\mu}), \; \kappa = 1.7928$$

Les fonctions $F_i(q_2^2)$ sont appelées facteurs de forme élastiques ou fonctions de structure selon la valeur des variables q, p et p' :

$$q^2 = (p - p')^2 = p^2 + p'^2 - 2p^{\mu}p'_{\mu}$$

- Si $p'^2 = p^2$, on se situe dans le domaine élastique, et on utilise les facteurs de forme. F_1 et F_2 sont appelées facteur de forme électrostatique et facteur de forme magnétique.

- Si $p'^2 \neq p^2$ on se situe dans le domaine inélastique, qui correspond à un grand quadri-moment de transfert q_2^2. Dans ce domaine d'énergie, on sonde l'intérieur du proton ($\Delta E \sim \frac{\hbar c}{\Delta X}$ où ΔX représente la distance sondée). On utilise des fonctions de structure qui décrivent les distributions d'impulsion des différents constituants du proton.

Les fonctions $F_i(q^2)$ ont été déterminées à partir de mesures de sections efficaces dans des expériences sur cibles fixes et plus récemment à HERA. L'utilisation de ces fonctions sera précisée dans la partie suivante.

1.2 Générateur Monte Carlo : LPAIR

Plusieurs processus autres que l'interaction entre 2 photons peuvent être à l'origine de la création de paires de leptons:



Figure 1.2: création d'une paire de leptons par processus Cabibbo-Parisi et Drell-Yan

Le processus Drell-Yan est une interaction entre un quark du proton et un anti-quark issu de la matérialisation en paire $q\overline{q}$ d'un photon émis par l'électron incident. Dans le processus Cabibbo-Parisi, la paire de leptons créée est issue de l'annihilation du lepton incident avec un lepton provenant de la matérialisation d'un photon émis par le proton. Ces diagrammes ont des contributions faibles dans le domaine cinématique que nous considérons ici [3]

Dans toute analyse, il est nécessaire de comparer les données recueillies avec les prédictions théoriques du modèle standard. Nous utiliserons le générateur Monte Carlo LPAIR, qui permet de simuler des productions de paires de leptons chargés dans des collisionneurs e-e, e-p ou p-p. Ce générateur ne tient compte que du diagramme qui met en jeu deux photons.
Le calcul d'un processus de la forme $ep \rightarrow ep\ l^+l^-$ est effectué de la façon suivante : on commence par évaluer l'elément de matrice M du sous-diagramme $\gamma^*\gamma^* \rightarrow l^+l^-$. On calcule ensuite à partir des faisceaux de particules incidentes (e p) des flux de photons équivalents, que l'on convolue avec le processus central afin d'obtenir l'élément de matrice complet :

$$\sigma = \Phi(\gamma_e)\Phi(\gamma_p)|M|^2$$

Cette méthode est connue sous le nom d' approximation de Weizsäcker-Williams [5]. Il est possible de spécifier des fonctions de structure pour les particules incidentes.

Pour notre analyse, trois lots Monte-Carlo distincts ont été générés, correspondant à différentes valeurs de $Q^2 = -q^2$ et de masse du système hadronique final M_X. (q^2 est le quadri-moment de transfert et Q^2 la masse de la particule échangée).

- Lot élastique : $M_X = M_p$. Le proton reste sur sa couche de masse, on utilise les facteurs de forme hadronique pour le décrire.

- Lot quasi-élastique : M_X légèrement supérieure à M_p. Le proton est excité lors de l'interaction. L'état final est une particule plus lourde appelée



Figure 1.3: Domaines de description du proton en fonction de Q^2 et de la masse du système hadronique

résonance. Les résonances du proton sont de deux type : N(isospin $\frac{1}{2}$) et Δ(isospin $\frac{3}{2}$). Les facteurs de forme sont modifiés dans cette région.

- Lot inélastique : $M_X > M_P$. C'est un quark qui participe à l'interaction, on utilise donc des fonctions de structure. Le proton éclate et ses différents constituants s'hadronisent (création de nouvelles particules autour des quarks et des gluons qui ne peuvent rester à l'état libre). L'état final est constitué d'un grand nombre de particules dont la masse totale est supérieure à celle du proton.

La figure 1.3 montre ces différentes régions dans le plan (Q^2, M_X)

1.3 Motivations de l'étude

Notre étude est motivée par deux aspects : tester les prédictions théoriques du modèle standard et rechercher des phénomènes nouveaux.

1.3.1 Test du modèle standard

La production de paires de leptons dans les processus à deux photons constitue un bruit de fond important pour d'autres analyses actuellement menées au sein du groupe H1. En particulier, l'étude sur les leptons isolés [6] a mis en évidence un excès d'événements avec un muon isolé et de l'impulsion transverse manquante. Les muons très énergétiques interagissent peu avec la matière et traversent tout le détecteur sans être arrêtés. Les paires de muons créées par le processus $\gamma\gamma \rightarrow \mu^+\mu^-$ peuvent contribuer à ce genre d'événement si l'un des deux n'est pas détecté. La confirmation de l'excès observé ne peut se faire qu'après un contrôle rigoureux des taux d'événements et des distributions des variables cinématiques générées par LPAIR. Cette vérification est plus aisée dans le canal électron, où les énergies sont mesurées avec précision et tous les électrons sont bien détectés.

Les événements observés ont aussi la particularité d'avoir un système hadronique de très grande impulsion transverse (notée $P_T X$). Nous devrons vérifier si dans le canal électron il existe aussi un excès à grand $P_T X$, qui pourrait mettre en évidence une contribution des ordres supérieurs de QCD (radiation de gluons par les quarks par exemple) mal prise en compte par le générateur.

Enfin, si cet excès est réellement observé, son interprétation est une production anormale du boson W. Il pourrait aussi exister une production anormale du Z, facilement observable à partir des paires e^+e^-.

1.3.2 Recherche d'un signal "non standard"

De manière générale, les processus donnant naissance à des particules de grande impulsion transverse constituent un domaine privilégié pour la recherche de phénomènes nouveaux. Ils mettent en jeu des énergies importantes pour lesquelles les tests du modèle standard sont encore peu nombreux. Plusieurs exemples de signaux non standards observables dans notre canal multi-électron peuvent se trouver dans le cadre de nouveaux modèles:

Modèles composites : ils proposent une sous-structure pour les fermions, et prévoient la création de fermions excités. Certaines désexcitations peuvent être visibles dans notre canal, avec une signature particulière :
$e^* \rightarrow e\ Z^\circ \rightarrow\ e\ e^+\ e^-$ L'électron se désexcite en émettant un boson Z°. La masse invariante de la paire d'électrons créée doit être proche de la masse du Z°.
$\nu^* \rightarrow \nu\ Z^\circ \rightarrow \nu\ \ e^+\ e^-$ La paire doit aussi avoir une masse proche de celle du Z°. Le neutrino s'échappe du détecteur, l'état final doit montrer de l'énergie

manquante.
$\nu^* \rightarrow e\ W \rightarrow e^+\ e^-\ \nu$ Ce canal doit montrer de l'énergie manquante.

La SUperSYmétrie (SUSY) peut aussi nous apporter un candidat dans l'hypothèse de la violation de la R-parité ($R_P = (-1)^{3B+L+2S}$, où B, L et S sont les nombres baryoniques, leptoniques et le spin. R_P vaut +1 pour les particules du modèle standard et -1 pour les particules supersymétriques). La particule supersymétrique la plus légère (LSP), électriquement neutre et dont la masse est prédite autour de 100 GeV, pourrait se désintégrer en 3 particules du modèle standard $LSP \rightarrow e^+\ e^-\ \nu$. La paire d'électrons serait accompagnée d'énergie manquante.

Enfin, des théories plus générales que le modèle standard et prenant en compte des symétries supplémentaires prévoient de nouveaux bosons de jauges massifs, dont certains peuvent donner une paire e^+e^- (le Z' par exemple).

Chapitre 2

Identification des leptons dans le détecteur H1

Les données ont été collectées auprès du collisionneur HERA situé sur le site de DESY (DEutsche SYnchrotron) à Hambourg.

2.1 Présentation de l'expérience



Figure 2.1: Le site de DESY

HERA (Hadron Elektron Ring Anlage) est un accélérateur circulaire de 6,3 km de circonférence dans lequel tournent un faisceau de protons et un faisceau de leptons (électrons ou positrons) dans des anneaux indépendants.

Les électrons sont produits dans le préaccélérateur LINAC I et accélérés jusqu'à 12 GeV dans PETRA II avant d'être injectés dans HERA, où ils atteignent leur énergie nominale. Les protons, créés à partir d'hydrogène, sont préaccélérés jusqu'à 40 GeV puis envoyés dans HERA. Chaque faisceau est constitué de 210 paquets de particules.

Nous distinguerons 3 périodes de prise de données selon les énergies des faisceaux et leur nature :

années	leptons	protons	luminosité	$\sqrt{s}$
94-97	positrons 27.5 GeV	820 GeV	35.6 pb^{-1}	300 GeV
98-99	electrons 27.5 GeV	920 GeV	14.2 pb^{-1}	318 GeV
99-2000	positrons 27.5 GeV	920 GeV	31.4 pb^{-1}	318 GeV

4 expériences sont actuellement en fonctionnement sur l'anneau:
H1 et ZEUS sont des expériences généralistes (étude de la structure du proton, recherche de processus au-dela du modèle standard,...).
HERA-B étudie la physique du quark b.(violation CP)
HERMES étudie les protons polarisés

2.2 Détection et mesures

Le détecteur H1 est asymétrique du fait de la grande différence d'énergie entre les faisceaux : les particules produites lors d'une interaction sont projetées dans la direction du proton incident, que l'on définit comme la direction $z > 0$. Un système de coordonnées est attaché au détecteur : l'angle $\theta \in [0; \pi]$ est mesuré à partir de l'axe z et l'angle $\phi \in [-\pi; \pi]$ est mesuré dans le plan transverse. Nous ne détaillerons que les sous-détecteurs utiles pour notre analyse. Plus de renseignements pourront être trouvés dans [12].

2.2.1 Détecteurs de traces

Trajectographes en silicium : ce sont des semi-conducteurs situés au centre du détecteur, qui laissent passer le courant lorsqu'ils sont traversés par des particules chargées. Leur très bonne résolution spatiale permet de déterminer avec précision la position du vertex d'interaction.
Chambres proportionnelles à fils et à dérive : Ces systèmes permettent la reconstruction des trajectoires de particules chargées. Le principe est le suivant : ces chambres sont remplies de gaz soumis à un champ électrique. Les particules chargées qui traversent l'enceinte ionisent ce gaz, et les électrons arrachés sont collectés sur les fils. Les trajectoires sont reconstruites à partir des signaux provenant des fils touchés, dont la position est connue, et à partir du temps de dérive des charges.
Ces chambres sont entourées d'une bobine supraconductrice qui fournit un champ magnétique de 1.15 Tesla. Le rayon de courbure des traces permet de retrouver le signe et l'impulsion de la particule ($P = qRB_{\perp}$).